

نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی‌تایمی
در پیش‌بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD):
مطالعه‌ای در جمعیت غیر بالینی

**Role of Childhood Maltreatment and Alexithymia in
Predicting Borderline Personality Disorder:
A Study in a Non-Clinical Population**

Majid Mahmoud Alilou, Ph.D.

Tabriz University

Touraj Hashemi, Ph.D.

Tabriz University

Mansour Bayrami, Ph.D.

Tabriz University

Abbas Bakhshipour, Ph.D.

Tabriz University

Mohammad Amin Sharifi, Ph.D.*

Counseling Center, Qazvin University Medical Sciences

دکتر مجید محمودعلیلو

دانشگاه تبریز

دکتر تورج هاشمی

دانشگاه تبریز

دکتر منصور بیرامی

دانشگاه تبریز

دکتر عباس بخشی‌پور

دانشگاه تبریز

دکتر محمدامین شریفی

مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چکیده: اختلال شخصیت مرزی (BPD) اختلالی چندبعدی و ناهمگون است و تحقیقات انجام‌شده در سه دهه اخیر، به‌طور وسیع نشان داده‌اند که کودک‌آزاری یکی از عوامل بیماری‌زا برای اختلال شخصیت مرزی محسوب می‌شود. هدف اصلی از مطالعه حاضر، پیش‌بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی‌تایمی، در نمونه‌ی غیربالینی بزرگسال است. بدین منظور، ۴۱۳ شرکت‌کننده از دانشجویان دانشگاه تهران به شیوه نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از مقیاس شخصیت مرزی (BPS)، مقیاس خودگزارش‌دهی کودک‌آزاری (CASRS)، و مقیاس آلکسی‌تایمی تورنتو (TAS-20) استفاده شد. داده‌های خام به‌دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش فعلی، به تحقیقات قبلی نزدیک است. نتایج نشان می‌دهند که مدل نظری برآزش مناسبی دارد و تجارب تروماتیک دوران کودکی (به‌ویژه آزارهای هیجانی) و آلکسی‌تایمی، پیش‌بین‌های خوبی برای اختلال شخصیت مرزی هستند. علاوه بر این، یافته‌ها حاکی از آن هستند که آلکسی‌تایمی در رابطه بین بدرفتاری و نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی میانجی‌گری می‌کند.

Abstract: Borderline personality disorder (BPD) is a multidimensional and heterogeneous disorder. Research has shown substantially in the last three decades that child abuse is a pathogenic factor for borderline personality disorder. The main purpose of this study was to predict the borderline personality disorder on the basis of childhood maltreatment and alexithymia, in nonclinical young adults. In this regard, 413 participants were selected using multistage sampling among all students studying in Tehran University. The Borderline Personality Scale (BPS), Child Abuse Self Report Scale (CASRS), and Toronto Alexi-thymia Scale (TAS-20) were used to measure variables. The raw data collected, was analyzed by structural equation modeling. The findings were similar to results of previous studies. The results indicate that theoretical model has a good fitness and childhood traumatic experiences (especially emotional abuse) and alexithymia are good predictors for borderline personality disorder. In addition, results revealed that alexithymia mediated relationship between maltreatment and BPD symptoms.

کلید واژه‌ها: اختلال شخصیت مرزی؛ بدرفتاری دوران کودکی؛ آلکسی‌تیمی

Keywords: borderline personality disorder; childhood maltreatment; alexithymia

صفحات: ۷۳-۹۶

*psychology.sharifi@gmail.com